



Modelo de Bula  
PACIENTE



**CIFLOGEX<sup>®</sup>**  
cloridrato de benzidamina

CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.

PASTILHA

3,0 MG/PASTILHA



## Modelo de Bula PACIENTE



### I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Ciflogex<sup>®</sup>  
cloridrato de benzidamina 3,0 mg/pastilha

#### APRESENTAÇÃO

Pastilha nos sabores menta-limão *diet*, laranja, mel – limão, menta – limão e cereja: embalagens com 12 pastilhas.

#### USO ORAL

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS

#### COMPOSIÇÃO

Cada pastilha sabor menta – limão *diet* contém:

cloridrato de benzidamina..... 3,0 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 pastilha

\*equivalente a 2,68 mg de benzidamina

\*\*aroma de menta – limão, corante amarelo de tartrazina, corante azul indigotina, isomalt ST tipo F, acessulfamo, talco farmacêutico e água purificada.

Cada pastilha sabor laranja contém:

cloridrato de benzidamina..... 3,0 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 pastilha

\*equivalente a 2,68 mg de benzidamina

\*\*aroma de laranja, corante amarelo crepúsculo, talco farmacêutico, sacarose, glicose e água purificada.

Cada pastilha sabor mel – limão contém:

cloridrato de benzidamina..... 3,0 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 pastilha

\*equivalente a 2,68 mg de benzidamina

\*\*aroma de mel, aroma de menta – limão, corante amarelo de tartrazina, talco farmacêutico, sacarose, glicose e água purificada.

Cada pastilha sabor menta – limão contém:

cloridrato de benzidamina..... 3,0 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 pastilha

\*equivalente a 2,68 mg de benzidamina

\*\*aroma de menta – limão, corante amarelo de tartrazina, corante azul indigotina, talco farmacêutico, sacarose, glicose e água purificada.

Cada pastilha sabor cereja contém:

cloridrato de benzidamina..... 3,0 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 pastilha

\*equivalente a 2,68 mg de benzidamina

\*\*aroma de cereja, corante vermelho Bordeaux, talco farmacêutico, sacarose, glicose e água purificada.

### II. INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Ciflogex<sup>®</sup> é destinado ao tratamento de processos inflamatórios e dolorosos da boca e garganta porque apresenta propriedades antiinflamatória, analgésica e anestésica.



## Modelo de Bula PACIENTE



### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O efeito tripla ação do Ciflogex<sup>®</sup> (atuação enquanto antiinflamatório, analgésico e anestésico bucal) ocorre porque a benzidamina tem o efeito direto nas células onde existe o processo inflamatório. Ele age onde é necessário nos tecidos inflamados e seus efeitos se manifestam somente nas áreas alteradas, ajudando a curar o local inflamado.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ciflogex<sup>®</sup> não deve ser utilizado por pacientes que tenham alergia ao cloridrato de benzidamina ou aos demais componentes da fórmula.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 6 anos.**

Ciflogex<sup>®</sup> pastilha nos sabores laranja, mel – limão, menta – limão e cereja:

**Atenção: Este medicamento contém Açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.**

Ciflogex<sup>®</sup> pastilha nos sabores menta – limão *diet*, menta – limão e mel – limão:

**Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de insuficiência renal consulte seu médico antes de utilizar Ciflogex<sup>®</sup>.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

Ciflogex<sup>®</sup> pastilha nos sabores laranja, mel – limão, menta – limão e cereja:

**Atenção: Este medicamento contém Açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.**

Ciflogex<sup>®</sup> pastilha nos sabores menta – limão *diet*, menta – limão e mel – limão:

**Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Ciflogex<sup>®</sup> pastilha deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características do produto:

Ciflogex<sup>®</sup> pastilha sabor menta – limão *diet*: pastilha circular, face plana de cor verde, sabor e odor característico de menta – limão.

Ciflogex<sup>®</sup> pastilha sabor laranja: pastilha circular, face plana, sabor e odor característico de laranja.

Ciflogex<sup>®</sup> pastilha sabor mel – limão: pastilha circular, face plana de cor amarelada, sabor e odor característico de mel – limão.

Ciflogex<sup>®</sup> pastilha sabor menta – limão: pastilha circular, face plana de cor verde, sabor e odor característico de menta – limão.

Ciflogex<sup>®</sup> pastilha sabor cereja: pastilha circular, face plana de cor vermelha, sabor e odor característico de cereja.



## Modelo de Bula PACIENTE



**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Dissolver uma pastilha na boca, duas ou mais vezes ao dia até o alívio dos sintomas.

Limite máximo diário de 10 pastilhas.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.**

### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Retomar o tratamento até o alívio dos sintomas.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Podem ocorrer reações de hipersensibilidade, incluindo urticária, fotossensibilidade, e broncoespasmo muito raramente.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

Em caso de ingestão acidental de doses elevadas, poderão ocorrer agitação, ansiedade, alucinações e convulsões.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **III- DIZERES LEGAIS**

Reg. MS 1.4381.0080

Farm. Resp.: Charles Ricardo Mafra

CRF-MG 10.883

#### **Fabricado por:**

**ATLANTE BALAS E CAMELOS LTDA.**

Rua Geraldo Bizutti, 280 Piracicaba/SP

CEP: 13413-090 - CNPJ: 54.360.508/0002-00



**Modelo de Bula  
PACIENTE**



**Embalado por:**

**CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

**Av. Cel. Armando Rubens Storino, 2750 - Pouso Alegre/MG**

**CEP: 37550-000 - CNPJ: 02.814.497/0002-98**

**Registrado por:**

**CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. Rua**

**Engenheiro Prudente, 121 - São Paulo/SP**

**CEP: 01550-000 - CNPJ: 02.814.497/0001-07**

**Indústria Brasileira**

**® Marca Registrada**

**Logo do SAC**

**0800 704 46 47 [www.grupocimed.com.br](http://www.grupocimed.com.br)**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE  
ORIENTAÇÃO MÉDICA.**





Modelo de Bula  
PACIENTE



**Histórico de alteração para a bula**

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data da aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
10/10/2014	---	10457- SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	---	---	---	---	. Para quê este medicamento é indicado? .Como este medicamento funciona? .Quando não devo usar este medicamento? .O que devo saber antes de usar este medicamento? . Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? . Como devo usar este medicamento? . O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? . Quais os males	VP/VPS	. 3,0 MG X 12 (SABOR MENTA – LIMÃO DIET) . 3,0 MG X 12 (SABOR LARANJA) . 3,0 MG X 12 (SABOR MEL – LIMÃO) . 3,0 MG X 12 (MENTA – LIMÃO) . 3,0 MG X 12 (SABOR CEREJA)



## Modelo de Bula

### PACIENTE



							<ul style="list-style-type: none"><li>que este medicamento pode me causar?</li><li>. o que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?</li><li>. Indicações</li><li>. Resultados de eficácia</li><li>. Características farmacológicas<ul style="list-style-type: none"><li>. Contra – indicações</li></ul></li><li>. Advertências e precauções</li><li>. Interações medicamentosas</li><li>. Cuidados de armazenamento do medicamento</li><li>. Posologia e modo de usar</li><li>. Reações adversas</li><li>. Superdose</li></ul>		
09/02/2015	---	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula RDC 60/12	---	---	---	---	. Dizeres legais	(VP/VPS)	3,0 MG X 12 (SABOR ES MENTA - LIMÃO DIET), LARANJA, MEL-LIMÃO, MENTA-LIMÃO E CEREJA.



Modelo de Bula  
PACIENTE



**CIFLOGEX<sup>®</sup>**  
cloridrato de benzidamina

CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.

COLUTÓRIO *SPRAY*

1,5 MG/ML





## Modelo de Bula PACIENTE



### I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Ciflogex<sup>®</sup>  
cloridrato de benzidamina 1,5 mg/mL

### APRESENTAÇÕES

Colutório *spray* nos sabores menta e mel: frasco com 30 mL.

**USO BUCAL – Não ingerir**

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS**

### COMPOSIÇÃO

Cada mL de colutório *spray* sabor mel contém:

cloridrato de benzidamina..... 1,5 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 mL

\*equivalente a 1,34 mg de benzidamina

\*\*álcool etílico, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, ciclamato de sódio, sorbitol, corante amarelo crepúsculo, corante azul brilhante, água purificada e aroma de mel.

Cada mL de colutório *spray* sabor menta contém:

cloridrato de benzidamina..... 1,5 mg\*

Excipientes\*\*q.s.p.:..... 1 mL

\*equivalente a 1,34 mg de benzidamina

\*\*álcool etílico, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, ciclamato de sódio, sorbitol, corante amarelo de tartrazina, corante azul indigotina, mentol cristal, água purificada e óleo de rícino polietoxilado.

### II. INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Ciflogex<sup>®</sup> é destinado ao tratamento de processos inflamatórios e dolorosos da boca e garganta porque apresenta propriedades anti-inflamatória, antiséptica, analgésica e anestésica.

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O efeito tripla ação do FLOGORAL (atuação enquanto anti-inflamatório, analgésico e anestésico bucal) ocorre porque a benzidamina tem o efeito direto nas células onde existe o processo inflamatório. Ele age onde é necessário nos tecidos inflamados e seus efeitos se manifestam somente nas áreas alteradas, ajudando a curar o local inflamado.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ciflogex<sup>®</sup> não deve ser utilizado por pacientes que tenham alergia ao cloridrato de benzidamina ou aos demais componentes da fórmula.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 6 anos.**

Ciflogex<sup>®</sup> colutório *spray* no sabor menta:

**Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de insuficiência renal (alteração da função dos rins), consulte seu médico antes de utilizar Ciflogex<sup>®</sup>.



## Modelo de Bula PACIENTE



### **CIFLOGEX® NÃO DEVE SER INGERIDO.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Ciflogex® não contém açúcar.**

Ciflogex® colutório *spray* no sabor menta:

**Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Ciflogex® Colutório *spray* deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Características do produto:

Colutório *spray* sabor menta: Líquido transparente, de coloração verde-esmeralda, sabor e odor característico de menta.

Colutório *spray* sabor mel: Líquido transparente de cor amarelada, com sabor e odor de mel.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Fazer 2 a 6 nebulizações ao dia nas áreas inflamadas da boca e/ou garganta até o alívio dos sintomas. Limite máximo diário de 10 nebulizações.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Retomar o tratamento até o alívio dos sintomas.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Podem ocorrer reações de hipersensibilidade, incluindo urticária, fotossensibilidade, e broncoespasmo, muito raramente.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**



Modelo de Bula  
PACIENTE



**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Em caso de ingestão acidental de doses elevadas, poderão ocorrer agitação, ansiedade, alucinações e convulsões.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**III- DIZERES LEGAIS**

Reg. MS 1.4381.0080

Farm. Resp.: Charles Ricardo Mafra

CRF-MG 10.883

**Fabricado por:**

**CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

Av. Coronel Armando Rubens Storino, 2750

Pouso Alegre/MG CEP: 37550-000

CNPJ: 02.814.497/0002-98

**Registrado por:**

**CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

Rua Engenheiro Prudente, 121 - São Paulo/SP

CEP: 01550-000 - CNPJ: 02.814.497/0001-07

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

Logo do SAC

0800 704 46 47 [www.grupocimed.com.br](http://www.grupocimed.com.br)

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**





Modelo de Bula

PACIENTE



### Histórico de alteração para a bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do Expediente	Nº do expediente	Assunto	Data da aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
10/10/2014	---	10457-SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	---	---	---	---	. Para quê este medicamento é indicado? .Como este medicamento funciona? .Quando não devo usar este medicamento? .O que devo saber antes de usar este medicamento? . Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? . Como devo usar este medicamento? . O que devo fazer quando eu me esquecer de	VP/VPS	. 1,5 MG/ML COLUT FR PLAS OPC SPR X 30 ML SABOR MENTA  . 1,5 MG/ML COLUT FR PLAS OPC SPR X 30 ML SABOR MEL



## Modelo de Bula

### PACIENTE



							<ul style="list-style-type: none"><li>usar este medicamento?</li><li>. Quais os males que este medicamento pode me causar?</li><li>. o que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?</li><li>. Indicações</li><li>. Resultados de eficácia</li><li>. Características farmacológicas<ul style="list-style-type: none"><li>. Contra – indicações</li></ul></li><li>. Advertências e precauções</li><li>. Interações medicamentosas</li><li>. Cuidados de armazenamento do medicamento</li><li>. Posologia e modo de usar</li><li>. Reações adversas</li><li>. Superdose</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--